



Perda de peso: pacientes que usam medicamentos para emagrecer podem envelhecer o rosto em até

5 anos

São Paulo, janeiro de 2025 - A busca pelo emagrecimento rápido tem se tornado uma prática comum, levando muitas pessoas a adotar métodos que podem trazer consequências indesejáveis para a aparência do rosto. Um estudo recente da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, por exemplo, constatou que os pacientes que usam medicamentos para emagrecer mais rápido podem parecer menos radiantes e mais velhos do que a sua idade, aparentando até cinco anos a mais¹.

Mas, por que isso acontece? A dermatologista Priscilla Sarlos (CRM-RJ 5288506-1) explica que existem vários motivos. Entre eles, a perda de gordura responsável por esticar e acolchoar a pele, que contribui para uma aparência jovem, além da perda de colágeno e elastina, que impactam na qualidade e firmeza da pele. “Essas alterações resultam numa sensação de ‘derretimento facial’, que está associada à maior percepção de flacidez da pele do rosto. Nesses casos, em que há o desejo de recuperar a densidade e sustentação da pele, mas manter a aparência esbelta da face emagrecida, a aplicação de procedimentos estéticos injetáveis para estímulo de colágeno e melhora da qualidade de pele pode ajudar”, comenta.

Um desses tratamentos é o bioestimulador de colágeno [Sculptra®](#), indicado para melhorar a firmeza e sustentação da pele²⁻³. Ele possui duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno^{4,a} e estimula sua produção na pele em 66,5%⁵, com duração comprovada de mais de 2 anos⁶.

Além dele, outro tratamento possível é o ácido hialurônico injetável. Uma das opções disponíveis no mercado é [Restylane®](#), que proporciona resultados personalizados^{7-11,b} e naturais na opinião dos especialistas¹². A marca ainda conta com sua versão [Skinboosters™](#), que melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros¹³⁻¹⁶.

A Dra. Priscilla Sarlos explica, inclusive, que a associação desses dois tratamentos pode proporcionar resultados ainda mais satisfatórios. “A vantagem do uso dos bioestimuladores de colágeno é restauração da firmeza e

sustentação da pele, enquanto os skinboosters, por exemplo, agem de dentro para fora, hidratando-a de maneira profunda. Dessa forma, ambos proporcionam benefícios que resultam na melhora da qualidade da pele", complementa a dermatologista.

Atenta a esta oportunidade, a Galderma, empresa de soluções para o cuidado com a pele, lançou a técnica Firm&Refresh¹⁷, que combina, no mesmo protocolo de tratamento, a aplicação de Sculptra® e Restylane® SkinboostersTM. Outra técnica já conhecida é a Firm&Lyft^{TM18}, que associa Sculptra® e Restylane® para combater a flacidez e promover a estruturação e sustentação dos tecidos da face, contribuindo para o efeito lifting a longo prazo.

“Além da firmeza e qualidade da pele, muitas vezes os pacientes precisam de tratamentos relacionados à reestruturação facial e reposição de áreas de perda volumétrica, situações em que os preenchedores de ácido hialurônico são muito bem-vindos. Isso porque hoje existem diferentes tipos de géis, que nos permitem, por exemplo, dar sustentação e volume a um número maior de áreas da face”, complementa a Dra. Priscilla.

É importante ressaltar que a aplicação de Sculptra® e Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

a. Estudo experimental.

b. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

Referências

1. Humphrey CD & Lawrence AC. Implications of Ozempic and other GLP-1 receptor agonists for facial plastic surgeons. *Facial Plast Surg.* 2023;39:719-721

2. Machado Filho CDS et al. *PolyLlactic acid: a biostimulating agent. Surg Cosmet Dermatol* 2013;5(4):345-50.
3. Stein P et al. *The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. Journal of Dermatological Science* 78 (2015) 26–33
4. Oh S, Lee JH, Kim HM, Batsukh S, Sung MJ, Lim TH, Lee MH, Son KH, Byun K. Poly-L-Lactic Acid Fillers Improved Dermal Collagen Synthesis by Modulating M2 Macrophage Polarization in Aged Animal Skin. *Cells*. 2023 May 5;12(9):1320
5. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg*. 2013 Jun;39(6):915-22.
6. Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol*. 2010 Mar;62(3):448-62.
7. Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. *Dermatol Surg*. 2018 Jun;44(6):826-832.
8. Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. *Dermatol Surg*. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.
9. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. *Dermatol Surg*. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.
10. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. *J Drugs Dermatol*. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

11. Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.
12. Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)
13. Belmontesi M, De Angelis F, Di Gregorio C, Iozzo I, Romagnoli M, Salti G, Clementoni MT. Injectable Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid as a Skin Quality Booster: An Expert Panel Consensus. J Drugs Dermatol. 2018 Jan
14. Wu Y et al. A randomized study showing improved skin quality and aesthetic appearance of dorsal hands after hyaluronic acid gel treatment in a Chinese population. J Cosmet Dermatol 2020
15. Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov
16. Kim, J. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2014;20(2):97-103.
17. Saito F, et al. Concurrent application of injectable Poly-LLactic acid and hyaluronic acid for facial rejuvenation. Poster apresentado no International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 1-3 Fevereiro 2024, Paris, França.
18. Sarubi J, et al. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.

Esconder

Compartilhe este artigo