



Mitos e verdades sobre Restylane®

O ácido hialurônico é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo, que também pode ser utilizada através de tratamentos injetáveis ou cremes, de acordo com o objetivo de cada um. No caso dos preenchedores, os resultados do tratamento podem servir para correção de volume e assimetrias, definição de contorno ou de traços do rosto, realce de áreas que valorizem a autenticidade da face e até mesmo para amenizar rugas e linhas finas.

Saiba mais sobre a linha da Galderma através de uma lista de mitos e verdades sobre o produto!

Quais são os maiores mitos sobre Restylane®?

Todos que fazem o tratamento ficam iguais.

Mito! Os preenchedores Galderma possibilitam um tratamento personalizado, de acordo com as características do paciente, resultado desejado e área de aplicação¹.

O gel é o mesmo, o que muda é apenas a técnica do profissional.

Mito! Restylane® possui a mais ampla variação de textura do gel e o portfólio mais completo do mercado, com a melhor solução para cada indicação¹.

As chances de efeitos colaterais são grandes.

Mito! A Galderma oferece em sua linha de preenchedores o maior perfil de segurança entre os géis de ácido hialurônico disponíveis no mercado². Todas as linhas da família Restylane® quando expostas a hialuronidase são de rápida e fácil degradação³, o que significa que o nosso organismo consegue dissolver o produto sem grandes problemas.

E quanto às verdades? Quais são os maiores fatos sobre Restylane®?

O tratamento com Restylane® pode ser uma opção para lifting facial minimamente invasivo.

Verdade! A tecnologia NASHA® presente na composição dos géis de ácido hialurônico proporciona firmeza e capacidade superior de lifting⁴.

O efeito é duradouro.

Verdade! A linha de preenchedores da Galderma possui efeito duradouro de até 36 meses⁵.

Apenas profissionais de saúde habilitados podem aplicar Restylane®.

Verdade! Por se tratar de um procedimento minimamente invasivo, é importante que ele seja feito por um profissional de saúde que seja habilitado a práticas injetáveis. Por isso, se você se interessou pelas possibilidades do tratamento com Restylane® procure um profissional qualificado e pergunte pela linha de preenchedores de ácido hialurônico da Galderma!

BR-RES-2300005 | Novembro/22

1. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012;11:S5- S8.
2. Artzi O, Loizides C, Verner I et al. Resistant and recurrent late reaction to hyaluronic acid-based gel. Dermatol Surg 2016;42:31-37
3. Ferraz RM, Sandkvist U, Lundgren B. Degradation of Hylauronic Acid Fillers Using Hyaluronidase in an In
4. Weiss RA, et al. Effectiveness and Safety of Large Gel Particle Hyaluronic Acid With Lidocaine for Correction of Midface Volume Deficit or Contour Deficiency. Dermatol Surg 2016;42:699-709
5. Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50.

Compartilhe este artigo