



Firm&Lyft: o que você precisa saber sobre o tratamento

A associação de dois produtos tão únicos, em regiões distintas da face e com ações diferentes , proporciona efeitos incríveis de melhora nos contornos e proporções da face!

Por que a combinação Sculptra® e Restylane® proporciona resultados otimizados?

Os preenchedores Galderma da linha Restylane® possibilitam um tratamento personalizado, de acordo com as características do paciente, o resultado desejado e a área de aplicação³. Para chegar ao efeito desejado com a técnica de aplicação Firm&Lyft™ , o profissional de saúde habilitado utiliza o gel de ácido hialurônico de Restylane®, que proporciona firmeza e alta capacidade de lifting⁴, ou seja, de dar aquela "levantada" na pele do rosto.

Por outro lado, o efeito de Sculptra® melhora a qualidade da pele, restaura a firmeza perdida ao longo do tempo, por meio do tratamento da flacidez cutânea, e traz de volta a sua sustentação, aumentando a espessura da derme.⁵

Qual é o melhor momento da vida para realizar o procedimento?

Entender como funciona o processo de envelhecimento da pele da face é indispensável para se planejar e procurar pela técnica em um momento estratégico, que permita a prevenção dos sinais do passar do tempo antes que eles comecem a aparecer.

Você sabia que, a partir dos 20 anos de idade, o organismo passa a perder 1% do colágeno por ano?⁶

O envelhecimento cutâneo é um processo natural e inevitável, que reflete no aspecto e na qualidade da pele. Entretanto, outros fatores também influenciam diretamente as características da pele durante o envelhecimento, como: genética, traços únicos e estruturais de cada face e hábitos ligados ao estilo de vida.

Além disso, a perda da sustentação facial – causada pelas alterações ósseas, as quais também são naturais e acontecem ao decorrer do tempo – também pode gerar uma aparência mais cansada e o famoso [efeito buldogue](#),

que acarreta flacidez facial.

O planejamento dos tratamentos minimamente invasivos a partir do início da perda de colágeno pode proporcionar um impacto positivo na prevenção dos sinais do envelhecimento para a obtenção de resultados naturais.

Converse com um profissional da área da saúde habilitado a práticas injetáveis e entenda qual é o melhor momento para realizar a técnica Firm&Lyft™ 8 no seu caso. Um dos maiores benefícios dos produtos da Galderma é a possibilidade de personalização dos tratamentos, de acordo com as suas necessidades!

1. Sarubi J, Avelar LET, Nero MPD et al. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Mar 7. doi: 10.1111/jocd.14902.
2. Popenko N, Tripathi P, Devic Z, Karimi K, Osann K, Wong B. A quantitative approach to determining the ideal female lip aesthetic and its effect on facial attractiveness. JAMA Facial Plastic Surgery. 2017;19(4):261-267.
3. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012;11:S5- S8.
4. Weiss RA, et al. Effectiveness and Safety of Large Gel Particle Hyaluronic Acid With Lidocaine for Correction of Midface Volume Deficit or Contour Deficiency. Dermatol Surg 2016;42:699–709
5. Bohnert K, Dorizas A, Lorenc P, Sadick NS. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. Dermatol Surg. 2019 May;45(5):718-724.
6. Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.
7. Kapoor KM, Kapoor P, Heydenrych I, Bertossi D. Vision Loss Associated with Hyaluronic Acid Fillers: A Systematic Review of Literature. Aesthetic Plast Surg. 2020;44(3):929-944.

8. Sarubi J, Avelar LET, Nero MPD, Kamamoto C, Morais M. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Mar 7. doi: 10.1111/jocd.14902.

Compartilhe este artigo